

# Instrucciones de Uso

Adaptado de las instrucciones de uso aprobadas por la U.S. Food and Drug Administration

1

## Retire los artículos de la caja



- Coloque su caja de suministros sobre una superficie de trabajo limpia y plana, como una mesa.
- Saque el frasco de HEMANGEOL® y la jeringa de dosificación oral de la caja. **No agite la botella antes de usar.** Guarde la caja para el almacenamiento.

2

## Confirme la dosis



- Retire la jeringa de dosificación oral de la bolsa plástica.
- Deseche la bolsa plástica de forma segura. El cilindro de la jeringa tiene marcas en mililitros (mL).
- Examine las marcas en el cilindro de la jeringa de dosificación oral y encuentre la marca en mL que coincida con la dosis de HEMANGEOL en mL prescrita por su médico.

3

## Abra la botella



- Abra la botella de HEMANGEOL presionando hacia abajo la tapa de plástico mientras gira la tapa hacia la izquierda.
- Escriba en la caja la fecha en que abrió la botella por primera vez.

4


## Inserte la jeringa



- Coloque la botella en su superficie de trabajo. Use una mano para sostener la botella en posición vertical. Use su otra mano para insertar la punta de la jeringa de dosificación oral en el adaptador de jeringa en la parte superior de la botella. Empuje el émbolo hasta el fondo.
- No retire el adaptador de la jeringa. Si falta el adaptador de la jeringa, hable con su farmacéutico.

5

## Retire la dosis



- Use una mano para sujetar la jeringa de dosificación oral en su lugar. Con la otra mano, dé la vuelta a la botella.
- Tire del émbolo hacia atrás hasta que la parte superior del émbolo se alinee con la marca en el cilindro de la jeringa que coincida con la dosis de HEMANGEOL recetada por su médico. La dosis de su hijo puede ser diferente a la dosis que se muestra en esta imagen.

6

## Buscar burbujas de aire



- Compruebe si hay burbujas de aire en la jeringa de dosificación oral. Si ve burbujas de aire, empuje el émbolo hacia la botella lo suficiente como para eliminar las burbujas de aire grandes y luego tire hacia atrás hasta la dosis medida.

7

## Retire la jeringa



- Ponga el frasco en posición vertical de nuevo y colóquelo sobre su superficie de trabajo. Retire la jeringa dosificadora oral del frasco. No empuje el émbolo durante este paso.
- El adaptador de jeringa debe permanecer unido al frasco.

8

## Dar HEMANGEOL a su hijo



- Administre lentamente el HEMANGEOL en la boca de su hijo después de colocar la jeringa de dosificación oral contra el interior de la mejilla oprimiendo el émbolo.
- Mantenga a su hijo en posición erguida durante unos minutos inmediatamente después de administrar una dosis de HEMANGEOL.

- Si es necesario, puede diluir la dosis de HEMANGEOL en una pequeña cantidad de leche o jugo de frutas y dársela a su hijo en un biberón. Si su hijo escupe una dosis o si no está seguro de si recibió todo el medicamento, no le dé otra dosis. Espere hasta la siguiente dosis programada.

9


## Cerrar la botella



- Vuelva a colocar la tapa de plástico en la botella girándola en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha).

10

## Limpiar la jeringa



- Limpie la jeringa de dosificación oral después de cada uso enjuagándola con agua limpia del grifo.
  - No desarme la jeringa de dosificación oral.
  - No use ningún jabón o producto a base de alcohol para limpiar. Seque el exterior.
  - No coloque la jeringa dosificadora oral en un esterilizador o lavavajillas.